



MDA basecamp | Mobile Drogenarbeit z6
anonym - kostenlos - vertraulich

+43 (0)699 11 86 96 76 | Dreiheiligenstrasse 9 | 6020 Innsbruck
www.drogenarbeitz6.com | www.onlinedrogenberatung.at

ZVR-Zahl: 445057252

AKTUELLES DRUG CHECKING ERGEBNIS AUS INNSBRUCK:

LSD-Trip als 25I-NBOMe, 25C-NBOMe und 25H-NBOMe analysiert

Februar 2016

Als LSD zur Analyse gebracht:

Tatsächliche Inhaltsstoffe:

25I-NBOMe (1360 µg)*, 25C-NBOMe (45 µg) und 25H-NBOMe (25 µg)

Darreichungsform: Trip

Farbe: weiß, gelb, orange gemustert

Bezug: Innsbruck

Userbericht: **ca. 1,5 Stunden Atemnot und Schweißausbruch**

***extrem hohe Dosierung!!**

Bemerkung: Im Unterschied zu LSD schmecken NBOMes bitter.



In Innsbruck wurde in einem als LSD zur Testung gebrachten Trip die neuen psychoaktiven Substanzen **25I-NBOMe, 25C-NBOMe und 25H-NBOMe analysiert. Da Dosierungen ab 700 µg (Mikrogramm) bei 25I-NBOMe als sehr stark gelten, ist die Substanz extrem überdosiert!!**

Aufgrund der hohen Dosierung, der schwierigen Handhabung und des Risikopotentials raten wir dringend vom Konsum ab!

Achtung: Wie die meisten neuen psychoaktiven Substanzen sind NBOMes kaum erforscht. Informationen beruhen hauptsächlich auf User-Berichten.

NBOMes wirken im Mikrogrammbereich und werden **sublingual** konsumiert (Trip/Pulver wird unter die Zunge gelegt, Substanz wird von der Mundschleimhaut aufgenommen) oder **inhaliert**. **Vom nasalen Konsum (Schnupfen) ist abzuraten!** Bei **oraler Einnahme** kann es zu einer sehr schwachen oder zeitlich verzögerten Wirkung kommen, wodurch die **Gefahr des Nachlegens und damit möglichen gefährlichen Überdosierungen** steigt. Diese Einnahme der Substanz kann nicht nur zu einer starken Wirkung führen, sondern sie erhöht auch das **Risiko lebensbedrohlicher Durchblutungsstörungen**.

Beim Hauptwirkstoff des Trips - 25I-NBOMe - handelt es sich um die selbe Substanz, die bereits **am Silvesterabend in Innsbruck 13 Personen mit Symptomen einer Überdosierung (Herzrasen, Krämpfe, Agitiertheit, Angst- und Panikattacken, Paranoia, Zittern, unwillkürliche Muskelkontraktionen etc.) ins Krankenhaus brachte**. Kürzlich wurde außerdem bei Checkit! in Wien ebenfalls ein Trip als LSD zu Testung gebracht, der ausschließlich NBOMes enthielt!!





MDA basecamp | Mobile Drogenarbeit z6

anonym - kostenlos - vertraulich

+43 (0)699 11 86 96 76 | Dreiheiligenstrasse 9 | 6020 Innsbruck

www.drogenarbeitz6.com | www.onlinedrogenberatung.at

ZVR-Zahl: 445057252

25I-NBOMe

25I-NBOMe gehört zur Gruppe der Phenethylamine und ist ein Derivat (Ableitung) von 2C-I.

Dosis: ab 0,05 mg = 50 µg (Mikrogramm) bis max. 700 µg. **Die Dosierung ist visuell schwer einzuschätzen, wodurch es leicht zu Überdosierungen kommen kann!**

Wirkungseintritt: sublingual nach ca. 15 bis 120(!) min., inhaliert nach 5 bis 60(!) Min.

Wirkdauer: sublingual 6-10 (!) Std., inhaliert 4-6 Std.

Wirkung: Verstärkte Wahrnehmung der Verdauung und des Darms sowie sensibilisiertes Tastgefühl. Visuelle Effekte stellen sich zwar ein, stehen aber weniger im Vordergrund als bei LSD. **Gemäß User-Berichten wirken NBOMes von Mal zu Mal unterschiedlich, die Wirkung lässt sich nicht voraussagen, auch wenn die gleiche Dosis eingenommen wurde.** Der Konsum führt nicht zur Appetitlosigkeit, einem trockenen Mund oder seltsamer Sensorik (Geschmacksinn) und unterscheidet sich somit deutlich von LSD, DOI, 2C-B und 2C-I.

Risiken: Hinweisen zufolge kann es zu **peripheren Gefäßverengungen** kommen, welche medizinisch behandelt werden muss. Symptome sind Kälte, Blauanlaufen und taube Finger, Lippen, Nase und andere Extremitäten (Gliedermaßen). Das Taubheitsgefühl kann bis zu einer Woche nach dem Konsum anhalten. Der Konsum kann auch zu Schwellungen an Händen, Füßen oder Gesicht führen.

25C-NBOMe, 25H-NBOMe: es wird auf die Ausführungen zu 25I-NBOMe verwiesen.

Safer Use

Solltest du dich trotz gesundheitlicher und rechtlicher Risiken für den Konsum von LSD entscheiden, **lass deinen Trip unbedingt testen.**

Entscheidest du dich wissentlich für den Konsum von NBOMes, dann **dosiere äußerst vorsichtig und lege keinesfalls nach!!**

<http://www.drogenarbeitz6.at/substanzen/safer-use.html>

Quellen: www.checkyourdrugs.at, www.saferparty.ch

