

# Vorsicht: hochdosierte LSD-Filze mit diversen Verunreinigungen

Name	Unbekannt
Grösse	6.6 x 7.1 mm
Farbe	blau, beige, schwarz
Inhaltsstoffe	<b>155.3 µg LSD</b> <b>85.9 µg Iso-LSD</b> <b>61.1 µg MDMA*HCl</b> <b>Mindestens 6 verschiedene Syntheseverunreinigungen</b>
Getestet in	Zürich (DIZ), 27. August 2019



## Risikoeinschätzung

**Über 150 µg LSD** können zu viel sein. Hohe Dosen erhöhen das Risiko selbst für erfahrene Konsumenten. Es können höchst intensive psychedelische Erlebnisse hervorgerufen werden, welche verstörend und angsteinflössend sein können. Auch paranoide Vorstellungen können vorkommen. Des Weiteren kann eine sogenannte Übersensibilität auftreten. Musik, Licht und andere Reize können dabei als extrem unangenehm empfunden werden. Auch eine Körper-Geist-Trennung kann auftreten.

Zusätzlich enthält dieser LSD-Filz 61.1 µg MDMA und mindestens sechs verschiedene Syntheseverunreinigungen. MDMA erzeugt in dieser Dosierung kaum Effekte und/oder Wechselwirkungen mit LSD. Das MDMA ist vermutlich durch eine Kontamination im Minigrip auf den Filz geraten. Die Syntheseverunreinigungen deuten auf eine unsachgemässe Herstellung hin. Da keine Informationen zu diesen Syntheseverunreinigungen vorliegen, geht man beim Konsum dieser Filze ein zusätzliches, unbekanntes Gesundheitsrisiko ein. Wir raten daher vom Konsum dieser Filze ab!

## Infos zu LSD

**Dosierung:** 20 bis 75µg werden als leicht, 75 bis 150µg werden als stark und über 150µg werden als sehr stark bezeichnet.

**Wirkungseintritt und –Dauer:** nach ca. 20 Min. / 6 bis 11 Std.

**Wirkung:** Die LSD-Wirkung ist sehr stark von Dosis, Set und Setting abhängig. Als Halluzinogen intensiviert und verfremdet LSD deine Sinneswahrnehmungen und das Raum-Zeit-Empfinden verändert sich stark. Deine Stimmung und deine Gefühle können sich abrupt verändern; von himmelhoch-jauchzend bis hin zu tod-traurig. Dabei können kreative Gedanken, neue Ideen oder spirituelle Erfahrungen entstehen. Bei hohen Dosierungen kann eine Loslösung vom eigenen Körper stattfinden.

**Nebenwirkungen:** Besonders in der Anfangsphase des Trips können leichte Atembeschwerden, Herzrasen, Schweissausbrüche, veränderter Blutdruck und Übelkeit auftreten. Es kommt zu einer starken Produktion von Speichel und Schleim. Die Körpertemperatur erhöht sich leicht, die Pupillen werden erweitert und die optische Fokussierung erschwert. Gähnen ohne Müdigkeit setzt ein. Die Risiken im psychischen Bereich sind von der Persönlichkeitsstruktur des Users/der Userin abhängig. Die Wahrnehmungsveränderungen können so intensiv sein, dass UserInnen sich von der Flut von Eindrücken überfordert fühlen. Vor allem bei Nichtbeachtung der Regeln betreffend Set und Setting kann es zu Fehlreaktionen, Orientierungsverlust, Panik, Paranoia und "Horrortrips" kommen.

**Langzeitrisiken:** Es besteht – auch bei einmaligem Konsum – die Gefahr, dass latente (verborgene) psychische Störungen ausgelöst werden können.

## Infos zu Iso-LSD

Das nicht psychoaktive iso-LSD entsteht bei der Herstellung von LSD und deutet auf eine unsachgemässe Synthese hin. Es gibt bis anhin keine wissenschaftlichen Belege darüber, ob iso-LSD die Wirkung von LSD auf irgendeine Art und Weise beeinflusst.

# Vorsicht: hochdosierte LSD-Filze mit diversen Verunreinigungen

## Safer Use Regeln

- Falls du keine Möglichkeit hast, Substanzen analysieren zu lassen, teste maximal einen Viertel oder einen Drittel Filz an, da Filze in sehr unterschiedlicher Dosierung im Umlauf sind.
- Warte nach der Einnahme 3 Stunden, da immer wieder auch Filze mit unerwarteten Wirkstoffen im Umlauf sind, welche einen späteren Wirkungseintritt haben können.
- Akzeptiere wenn die Wirkung zu Ende geht.