

AKTUELLE DRUG CHECKING ERGEBNISSE AUS INNSBRUCK

Februar 2024

Als Speed (Pulver, Paste) zur Analyse gebracht

Tatsächliche Inhaltsstoffe:

- Amphetamin (719 mg/g = 71,9% Wirkstoffgehalt) – Achtung hochdosiert!*
- Amphetamin (395 mg/g = 39,5% Wirkstoffgehalt) – Achtung hochdosiert!*, Koffein (600 mg/g)
- Amphetamin (115 mg/g = 11,5% Wirkstoffgehalt), Koffein (689 mg/g)
- Amphetamin (29 mg/g = 2,9% Wirkstoffgehalt), Koffein (646 mg/g), Phenethylamin (n.q.)
- Amphetamin (24 mg/g = 2,4% Wirkstoffgehalt), Koffein (633 mg/g), Phenethylamin (n.q.)
- Amphetamin (20 mg/g = 2% Wirkstoffgehalt), Koffein (666 mg/g), Phenethylamin (n.q.)
- Amphetamin (<10 mg/g = 1% Wirkstoffgehalt), Koffein (444 mg/g), Phenethylamin (n.q.)
- Koffein (413 mg/g), Phenethylamin (n.q.)

**Ab 250 mg/g=25% Wirkstoffgehalt gilt die Substanz als hochdosiert.*

Aufgrund des hohen Flüssigkeitsverlusts bei gleichzeitigem Konsum von Amphetamin und Koffein steigt die Gefahr der Dehydrierung; Blutdruck und Körpertemperatur sind erhöht. Gleichzeitiger Konsum bedeutet eine starke Belastung für das Herz-Kreislaufsystem. **Hohe Dosen Koffein (ab 500 mg)** fügen der Wirkung eine nervöse und unruhige Komponente hinzu. Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Schweißausbrüche, Kurzatmigkeit und Schlafstörungen sind wahrscheinlich. Durch die unspezifische Aktivierung des gesamten Organismus kann es auch zu Angstzuständen kommen.

Als MDMA (Pulver, Kristalle) zur Analyse gebracht

Tatsächliche Inhaltsstoffe:

- MDMA (856 mg/g = 85,6% Wirkstoffgehalt) – Achtung hochdosiert!*
- MDMA (818 mg/g = 81,8% Wirkstoffgehalt) – Achtung hochdosiert!*
- MDMA (792 mg/g = 79,2% Wirkstoffgehalt) – Achtung hochdosiert!*

**Ab 750 mg/g = 75% Wirkstoffgehalt gilt die Substanz als hochdosiert.*

Um Überdosierungen zu vermeiden und um das Risiko von Gesundheitsschäden zu minimieren, sollten **Dosierungen von 1,3 Milligramm MDMA pro Kilogramm Körpergewicht bei Frauen und 1,5 Milligramm MDMA pro Kilogramm Körpergewicht bei Männern nicht überschritten werden!** Nebenwirkungen wie „Kiefer mahlen“, Augen- und Nervenzucken, bis hin zu Krampfanfällen können bei hohen MDMA Dosen häufiger auftreten. Bei Überdosierungen steigt die Körpertemperatur stärker an (Gefahr eines Hitzschlags) und es kann zu unangenehmen Halluzinationen kommen. **Herz, Leber und Nieren** werden besonders stark belastet. An Folgetagen, nach der Einnahme hoher Dosen

MDMA, treten vermehrt **Depressionen, Konzentrationsschwächen, Schlafstörungen und Appetitlosigkeit** auf. Bei einer regelmäßigen hoch dosierten Einnahme von MDMA ist die Wahrscheinlichkeit, dass **irreparable Hirnschäden** entstehen, größer.

Als Kokain (Pulver) zur Analyse gebracht

Tatsächliche Inhaltsstoffe:

- Kokain (948 mg/g = 94,8% Wirkstoffgehalt) – Achtung hochdosiert!*
- Kokain (861 mg/g = 86,1% Wirkstoffgehalt) – Achtung hochdosiert!*
- Kokain (856 mg/g = 85,6% Wirkstoffgehalt) – Achtung hochdosiert!*
- Kokain (802 mg/g = 80,2% Wirkstoffgehalt) – Achtung hochdosiert!*
- Kokain (831 mg/g = 83,1% Wirkstoffgehalt) – Achtung hochdosiert!*
- Kokain (733 mg/g = 73,3% Wirkstoffgehalt), Procain (nicht quantifiziert)
- Kokain (435 mg/g = 43,5% Wirkstoffgehalt), Levamisol (225 mg/g), Phenacetin (183 mg/g)
- Kokain (292 mg/g = 29,2% Wirkstoffgehalt), Amphetamin (331 mg/g)
- Kokain (180 mg/g = 18,0% Wirkstoffgehalt), Koffein (75 mg/g), Procain (nicht quantifiziert)

*Ab 800 mg/g = 80% Wirkstoffgehalt gilt die Substanz als hochdosiert

Achtung!! Der durchschnittliche Wirkstoffgehalt in Kokain ist extrem hoch!

Um Überdosierungen zu vermeiden unbedingt niedrig dosieren und nicht nachlegen. Verzichte auf jeglichen Mischkonsum, auch mit Alkohol oder Energydrinks!!

Als Ketamin zur Analyse gebracht:

Tatsächliche Inhaltsstoffe:

- Ketamin (939 mg/g = 93,9% Wirkstoffgehalt) – Achtung hochdosiert!*
- Ketamin (896 mg/g = 89,6% Wirkstoffgehalt) – Achtung hochdosiert!*
- Ketamin (848 mg/g = 84,8% Wirkstoffgehalt) – Achtung hochdosiert!*
- Ketamin (802 mg/g = 80,2% Wirkstoffgehalt) – Achtung hochdosiert!*
- Ketamin (790 mg/g = 79,0% Wirkstoffgehalt) – Achtung hochdosiert!*
- Ketamin (752 mg/g = 75,2% Wirkstoffgehalt) – Achtung hochdosiert!*
- Ketamin (721 mg/g = 72,1% Wirkstoffgehalt) – Achtung hochdosiert!*
- Kokain (94 mg/g = 9,4% Wirkstoffgehalt), Koffein (15 mg/g)

*Ab 700 mg/g = 70% Wirkstoffgehalt gilt die Substanz als hochdosiert.

Als „unbekannt“ zur Analyse gebracht:

Tatsächliche Inhaltsstoffe:

- Morphin (nicht quantifiziert)

ACHTUNG!!

Der Wirkstoffgehalt psychoaktiver Substanzen variiert sehr stark und ist optisch NICHT erkennbar!

Beachte daher unbedingt die Safer Use Regeln:

- Dosiere niedrig und warte min. 2 Stunden, um die Wirkung zu erfahren.
- Verzichte auf Mischkonsum (auch mit Alkohol, Energydrinks oder Cannabis), da es zu unberechenbaren Wechselwirkungen kommen kann.
- Achte auf die Bedürfnisse deines Körpers: Trink' Wasser & mach' Pausen an der frischen Luft.
- Nutze Drug Checking - Angebote!

<https://www.drogenarbeit6.at/konsum/safer-use.html>

Weiterführende Infos zu den Inhaltsstoffen:

Quellen: www.checkyourdrugs.at, www.saferparty.ch

Koffein: Koffein macht wach, beschleunigt den Herzschlag und steigert vorübergehend die geistige Leistungsfähigkeit. In höheren Dosen, ab 300mg (ca. 8 Tassen Kaffee) erzeugt es Euphorie. Koffein entzieht dem Körper Flüssigkeit.

Bei hohen Dosen sind folgende Nebenwirkungen möglich: Schweißausbrüche, Herzflattern, Harndrang, Herzrhythmusstörungen, Wahrnehmungsstörungen, Zittern, Nervosität und Schlafstörungen. Bei dauerhaftem regelmäßigen Gebrauch besteht die Gefahr einer Abhängigkeit mit körperlichen Symptomen. Die Wechselwirkung zweier oder mehrerer psychoaktiver Substanzen, also auch die von Koffein mit Kokain, ist kaum einschätzbar und entspricht in der Regel nicht der Summe ihrer Einzelwirkungen. Die Kombination unterschiedlicher aufputschend wirkender Substanzen **belastet das Herzkreislaufsystem stark**, führt zu Temperaturanstieg und Flüssigkeitsverlust - es besteht eine erhöhte **Gefahr des Austrocknens**.

Levamisol: Levamisol ist ein Anthelminthikum (wird in der Tiermedizin gegen Wurmbefall eingesetzt), welches früher auch in der Humanmedizin Anwendung fand. Als Beimengung zu Kokain tritt die Substanz in den letzten Jahren gehäuft auf. Verschiedene Nebenwirkungen, die im Zusammenhang mit Levamisol berichtet wurden, sind unter anderem: allergische Reaktionen (Schwierigkeiten beim Atmen, Anschwellen der Lippen, der Zunge, des Gesichts) und Beeinträchtigung des zentralen Nervensystems (z.B. Verwirrungszustände oder Bewusstlosigkeit, extreme Müdigkeit). Die bedenklichste Nebenwirkung von Levamisol ist die Veränderung des Blutbildes, **Agranulocytosis**

genannt. Im Zuge dieser kommt es zu einer Reduktion der weißen Blutkörperchen, was in weiterer Folge – auf Grund von Immunschwäche – zu **lebensbedrohlichen Infektionen** führen kann.

Die Symptome die dabei auftreten können sind Schüttelfrost, Fieber, Sepsis, Schleimhaut-, Zungen- und Halsentzündungen, Infektion der oberen Atemwege, Infektionen im Analbereich und oberflächliches Absterben von Hautarealen.

Die Wahrscheinlichkeit der Ausbildung einer Agranulozytose steigt unabhängig von der aufgenommenen Dosis mit der Regelmäßigkeit der Levamisol-Einnahme. Am häufigsten tritt Agranulozytose auf, wenn Levamisol kontinuierlich 3-12 Monate eingenommen wird. Es sind aber auch Fälle bekannt, bei denen bereits nach weniger als drei Wochen nach der ersten Levamisol-Einnahme die Erkrankung diagnostiziert wurde.

Levamisol wird im Körper zu Aminorex verstoffwechselt. Aminorex hat eine amphetaminartige Wirkung. Bei gleichzeitigem Konsum von Kokain kommt es zu einer Wirkungsverlängerung, da die Wirkung von Aminorex einsetzt, wenn jene des Kokains nachlässt. Studien zeigen jedoch klar, dass Aminorex das **Risiko zur Entwicklung einer pulmonalen Hypertonie (=lebensgefährlicher Lungenhochdruck)** erhöht. Das Risiko besteht insbesondere bei wiederholtem Vorkommen von Aminorex im Körper. Der Lungenhochdruck wird dabei beim Konsumieren nicht sofort festgestellt, sondern kann sich unter Umständen erst nach einigen Monaten in zunehmend eingeschränkter körperlicher Leistungsfähigkeit, Kreislaufstörungen und Müdigkeit äußern.

In welchem Ausmaß sich Levamisol in Aminorex umwandelt und ob das regelmäßige Konsumieren levamisolhaltigen Kokains tatsächlich zu Lungenhochdruck führen kann, ist gegenwärtig nicht geklärt. Zu bedenken gilt, dass eine pulmonale Hypertonie (Lungenhochdruck) tödlich verlaufen kann.

Phenacetin: Phenacetin ist ein Aminophenol-Derivat und wurde zur Schmerzbehandlung und Fiebersenkung verwendet. Wegen seiner karzinogenen und insbesondere nierenschädigenden Wirkung in Kombination mit anderen Schmerzmedikamenten ist dieses Arzneimittel seit 1986 nicht mehr im Handel. Phenacetin kann auch Erregung und Euphorie auslösen und wird wohl deshalb als Streckmittel eingesetzt.

Procain: Procain ist ein Lokalanästhetikum. Es wird in der Humanmedizin nur noch selten verwendet, da hierfür wirksamere, weit tiefer eindringfähige Stoffe, wie etwa Lidocain, zur Verfügung stehen.

Phenethylamin (PEA)

Phenethylamin (PEA) ist die Stammsubstanz der Stoffgruppe der Phenethylamine. Es ist in Pflanzen weit verbreitet und kommt in vielen Lebensmitteln (Käse, Fleisch, Tomaten, Spinat, Banane, Schokolade) vor. Es hat stimulierende Eigenschaften, wird jedoch im Körper sehr schnell abgebaut und entfaltet demnach keine psychoaktive Wirkung. In Kombination mit MAO-Hemmern kann es zu Blutdruckanstieg und anderen Wechselwirkungen kommen.



DROGENARBEIT Z6 **Drug Checking**

Dreiheiligenstrasse 9 | 6020 Innsbruck
+43 699 11 86 96 76 | drugchecking@drogenarbeitz6.at | www.drogenarbeitz6.at

